

【成分】

- ・ニコチン酸アミド（主成分）………苦味がある 水によく溶ける
熱に安定（水溶液は 120℃まで安定）
- ・乳糖水和物（賦形剤）………甘味がある 水によく溶ける
- ・バレイショデンプン（賦形剤）………水に溶けにくい
加温（60℃以上）でとろみが付く



【本剤は、通常、水で服用する散剤ですが、飲みづらい場合は以下をご参考にご指導ください】

☆お奨めの飲み方☆

- ・オブラートで包む
少量の場合はオブラートに包んだ後、水に軽く浸し、適量の水で服用。
- ・少量の水（又はお湯）で練る
小さい容器に、ごく少量の水で練る。
その後、水などを十分に摂取。
お湯で練るととろみが付いたり固まりますが、
主成分の効果に影響はありません。
- ・トロミのあるものと混ぜる
介護用のとろみ調整食品など
- ・味の濃いもの
薬と同量～2倍程度のアイスクリーム・はちみつ・シロップなどと混ぜる。水などを飲む。

熱い液体（お湯やお茶など）に混ぜると、デンプンの働きでとろみが付きます。経管投与などの際はご注意ください。

飲みにくくなるもの

- ・多量の水やお茶
上澄みは苦く、下にバレイショデンプンが沈殿し、飲みにくくなります。
 - ・フルーツ味のものとの混ぜる
ブドウやパイナップル味のジュース・ヨーグルト・ゼリーでは、苦味が強く感じられます。
 - ・ウーロン茶と混ぜる
- ※混ぜることにより効力が低下するものは、特にありません。

服薬補助ゼリーには、混ぜ込まずに挟み込むようにしてください。

薬を混ぜる場合は、飲む直前に1回分を混ぜてください。作り置きはしないでください。

《お問い合わせ先》ゾンネボード製薬株式会社
お客様相談室 [Tel:0120-042-171](tel:0120-042-171)

-メモ-